



Effydral[®]

Effydral[®] brusetablet indeholdende elektrolytter og laktose til hurtig rehydrering af kalve og grise med diarré og dehydrering. Anvendes understøttende efter behandling af diarré og dehydrering.

Anvendelse

Behandlingen påbegyndes så snart diarréen er konstateret.

1 brusetablet opløses i 1 liter lunkent vand. Opløsningen bør fremstilles umiddelbart før brug.

Kalv: De første 2 døgn gives 2 liter Effydralopløsning 2-3 gange dagligt (1 brusetablet til 1 liter vand). Hvis der også gives mælk, kan der f.eks. gives 1-2 liter Effydralopløsning efterfulgt af 1 liter mælk 1 time senere 2-3 gange dagligt. På 3. og 4. døgn gives 1 liter Effydralopløsning efterfulgt af 1 liter mælk.

Gris: Smågrise gives fri adgang til Effydralopløsningen. Fravænningsgrise gives fri adgang til Effydralopløsningen som tilskud til drikkevand. Opløsningen skal fornyes 1 gang i døgnet, og behandlingen bør fortsætte indtil diarréen er ophørt.

Deklaration

1 brusetablet indeholder:

Natriumchlorid 2,34 g

Kalciumchlorid 1,12 g

Natriumhydrogen karbonat 6,72 g

Citronsyre, vandfri 3,84 g

Laktose 32,44 g

Glycerin 2,25 g

Opbevaring: Alm. Temperatur, 15-25 °C.

Pakning: Papæske 48 tabl.