

PROPHYL S DESINFEKTIONSMIDDEL

Bakteriedræbende, gædræbende, virucid, svampedræbende, mykobakteriedræbende, kryptosporædræbende, coccidiocid, ascaridræbende.

Opløseligt flydende koncentrat (SL), der indeholder (i masseprocent)

Klorkresol: CAS-nr. 59-50-717,0 %.

Glykolsyre: CAS nr. 79-14-14,9 %.

Dosering ved desinfektion af bygninger og udstyr til husdyrbrug (PT3)

STAMMER	DOSIS	FORTYNDING	KONTAKTTID	STANDARD
Bakterier	1,0%	(1:100)	30 minutter	EN 14349 - 10°C
Gær	1,0%	(1:100)	60 minutter	EN 16438 - 10°C
Svampe	1,5%	(1:66)	60 minutter	EN 16438 - 10°C
Mykobakterier	1,5%	(1:66)	60 minutter	EN 14204 - 10°C
Indkapslet virus (fugleinfluenza og BVD)	1,0%	(1:100)	30 minutter	EN 14675 - 10°C
Nude-virus (bovin entero-virus og parvovirus)	2,0%	(1:50)	30 minutter	EN 14675 - 10°C
Cryptosporidium parvum	2,0%	(1:50)	2 timer	DVG-metodologi - 10°C
Coccidier (Eimeria spp.)	2,0%	(1:50)	2 timer	DVG-metodologi - 10°C
Ascaris suum	2,0%	(1:50)	2 timer	DVG-metodologi - 20°C

Dosering ved desinfektion af køretøjer og fodgængerfelter (PT3)

STAMMER	DOSIS	FORTYNDING	KONTAKTTID	STANDARD
Bakterier	2,0%	(1:50)	1 min (fodbad) og 5 min (køretøj)	EN 14349 - 10°C
Gær	2,0%	(1:50)	1 min (fodbad) og 5 min (køretøj)	EN 16438 - 10°C
Fugleinfluenza	1,0%	(1:100)	5 min (køretøj)	EN 14675 - 10°C
Bovine viral diarré	1,5%	(1:66)	5 min (køretøj)	EN 14675 - 10°C

Dosering desinfektion ved koldforstøvning (PT3)

STAMMER	DOSIS	KONTAKTTID	STANDARD
Bakterier	1,0 /ml/m ³	2 timer	EN 17272
Gær	1,0 /ml/m ³	2 timer	EN 17272
Svampe	1,0 /ml/m ³	2 timer	EN 17272
Virus	1,0 /ml/m ³	2 timer	EN 17272

**SPECIELT
BIOSIKKERHEDSDESINFEKTIONS-
MIDDEL TIL HUSDYRBRUG,
KØRETØJER OG FODBAD**

BIOCID PT3

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Testet på ikke-porøse overflader.

BRUGERVEJLEDNING



BRUG PROPHYL® S, HVER GANG DER RYDDES OP I DYRENES BYGNINGER.

1. For en bakteriedræbende, gædræbende, virucid, svampedræbende, mykobakteriedræbende effekt (ikke-porøse overflader)

Ved at sprøjte i bygninger

Fortynd Prophyl® S fra 1 til 2 % i vand alt efter den ønskede effekt (10 til 20 ml Prophyl® S til 1 liter opløsning). Desinficer ved at sprøjte opløsningen ved lavt tryk med en hastighed på 200 til 300 ml/m² til afløbspunktet. Lad det virke i 30 til 60 minutter. Forøg kontakttiden, hvis temperaturen er under 10 °C. Forny ved hver desinfektionscyklus.

I tilfælde af en vanskelig hygiejnesituation kan man sprøjte en 2 % opløsning af Prophyl® S og lade den virke i 12 til 24 timer, før man går ind i bygningerne.

Blødgøring af udstyr

Fortynd Prophyl® S fra 1 til 2 % i vand alt efter den ønskede effekt. Læg det tidligere rengjorte materiale i blød mindst 30 minutter i opløsningen. Forøg kontakttiden, hvis temperaturen er mindre end 10°C.

2. For en kryptosporicid, coccidiocid og ascaricid virkning

Fortynd Prophyl® S til 2 % i vand (20 ml Prophyl® S pr. 1 liter opløsning). Påfør på tidligere rengjorte overflader. Sprøjt opløsningen ved lavt tryk i en mængde på 400 til 500 ml/m² på gulve og vægge op til dyrehøjde. Lad det virke i 2 timer.

3. Fodbade og desinfektionsgrave

Fortynd Prophyl® S til 2 % i vand (20 ml Prophyl® S pr. 1 liter opløsning).

Fodbade

Sørg for, at fodbade har kapacitet på ca. 10 til 15 liter med en højde på mindst 10 cm. Fyld fodbade med Prophyl® S-opløsning, og placer dem ved indgangen til hver bygning på et sted, der er beskyttet mod dårligt vejr. Læg de tidligere rengjorte støvlesåler i blød i fodbadet. Lad opløsningen virke i 1 minut, minimum ved 10°C.

Desinfektionsgrav

Læg hjulgrave ved indkørslen til gården, anbefalet størrelse er 15 til 20 cm højde, 4 til 6 m lang, 4 m bred. Lad køretøjerne køre meget langsomt gennem hjulkassen og lad opløsningen virke i mindst 5 minutter.

Skift desinfektionsopløsningen en eller to gange om ugen afhængigt af opløsningens organiske belastning.

4. Desinfektion af køretøjer til dyretransport

Køretøjet skal først vaskes med en vaskemiddelopløsning, og der skal sikres en god skylning, før Prophyl® S påføres. Fortynd Prophyl® S med 2 % i vand (20 ml Prophyl® S pr. 1 liter opløsning). Sprøjt opløsningen på køretøjet med en hastighed på 100 til 200 ml/m² til afløbspunktet. Lad det virke i 5 minutter, minimum ved 10°C.

5. Desinfektion ved kold forstøvning

Brug 1,0 ml ren Prophyl® S pr. m³, eller 0,30 l Prophyl® S til 300 m³. Lad opløsningen virke i 2 timer.



Må ikke anvendes på overflader i kontakt med fødevarer eller foder. Emballagen må ikke genbruges. Opbevares i den lukkede og originale emballage væk fra lys og varme. Rengør påføringsudstyret med vand. **Brug biocider med forsigtighed. Læs sikkerhedsdatabladet og/eller etiketten før brug.**