

Elite CalPropy

Mineral dietetic feed for dairy cows to reduce the risk of reduced calcium levels. Cows with a risk of calcium imbalance need fast acting calcium in connection with calving. At the beginning of lactation, extra energy is also consumed, whereby the blood sugar drops. This drop in blood sugar can be prevented with propylene glycol. Elite CalPropy has combined fast acting calcium and a high content of propylene glycol.

Diætetisk fodertilskud til malkekøer til mindskelse af risikoen for nedsat calcium-niveau. Køer med risiko for calcium ubalance har brug for hurtigtvirkende calcium i forbindelse med kælvning. I starten af laktationen forbruges også ekstra energi, hvorved blodsukkeret falder. Dette fald i blodsukkeret kan forebygges med propylenglycol. Elite CalPropy har kombineret hurtigtvirkende calcium og et højt indhold af propylenglycol.

Kompletteringsfoderblanding for mjølkkor – diætfoder for at mindske risikoen for sjunkende calciumnivåer. Kor som er känsliga för kalciumobalans behöver i samband med kalvningen förebyggande och snabbt absorberande kalcium. Starten av mjölkproduktionen förtär också på energiförrådet och blodsockernivån sjunker. Denna sänkning kan förebyggas med propylenglykol. I Elite CalPropy har man förenat snabbt absorberande kalcium och ett högt innehåll av propylenglykol.

Composition:

Calcium chloride, propylene glycol, water, magnesium chloride, nutritional additives, sodium chloride

Analytical constituents:

Water	25 %
Ash	35 %
Calcium	12 %
Magnesium	0.4 %
Sodium	0.1 %

Nutritional additives:

Vitamin B1 3a821	200 mg/kg
Vitamin B2	150 mg
Vitamin B6 3a831	160 mg
Vitamin B12	2 mg/kg
D-panthenol 3a842	180 mg/kg

Instructions for use:

The dosing is done with a separate dosing gun. The tip of the gun is placed along the upper surface of the tongue facing the throat and as far as possible. Dosing should be done slowly in appropriate portions as the animals swallow. NOTE! Do not give to paralyzed cow. The product must be shaken.

Dosage:

Cows: Dose 330 ml one day before the expected calving or at the first signs of calving. Continue dosing at 12 hour intervals and, if necessary, for 2 days. 1 dose contains 50 g of calcium. **Sheep:** 40 -50 ml canned as soon as possible in case of symptoms of calcium deficiency. The dose can be given again 2-4 times a day.

Sammensætning:

Calciumchlorid, propylenglycol, vand, magnesiumchlorid, tilsætningsstoffer, natriumchlorid

Analytiske bestanddele:

Vand	25 %
Råaske	35 %
Calcium	12 %
Magnesium	0,4 %
Natrium	0,1 %

Tilsætningsstoffer:

Vitamin B1 3a821	200 mg/kg
Vitamin B2	150 mg
Vitamin B6 3a831	160 mg
Vitamin B12	2 mg/kg
D-panthenol 3a842	180 mg/kg

Brugsanvisning:

Produktet gives i munden med en doseringspistol. Spidsen af pistolen skal placeres i siden af munden og bagerst på tungen. Dosering skal udføres langsomt i passende portioner, som dyrene kan synke. OBS! Må ikke gives til dyr uden synkerefleks. Produktet bør omrystes inden brug

Dosering:

Køer: 330 ml indgives en dag før den forventede kælvning eller ved de første tegn på kælvning. Fortsæt doseringen med 12 timers intervaller og om nødvendigt i 2 dage. 1 dosis indeholder 50 g calcium. **Får:** 40-50 ml indgives så hurtigt som muligt i tilfælde af symptomer på calciummangel. Dosis kan gentages 2-4 gange om dagen.

Sammansättning:

Kalciumklorid, propylenglykol, vatten, magnesiumklorid, fodertillsatser, natriumklorid

Analytiska beståndsdelar:

Fuktighet	25 %
Aska	35 %
Kalcium	12 %
Magnesium	0,4 %
Natrium	0,1 %

Fodertillsatser: Näringstillsatser:

B1 -vitamin 3a821	200 mg/kg
B2 -vitamin	150 mg
B6-vitamin 3a831	160 mg
B12-vitamin	2 mg/kg
D-pantenol 3a842	180 mg/kg

Bruksanvisning:

Doseringen sker med en doseringspistol. Pistolens spets placeras längs med tungans övre yta riktad mot svalget och så långt som möjligt. Doseringen bör ske långsamt i lämpliga portioner i takt med att djuret sväljer. OBS! Får inte ges till djur utan sväljreflex. Produkten bör omskakas före användning.

Dosering:

Kor: Dosera 330 ml ett dygn före den beräknade kalvningen eller vid de första tecknen på kalvning. Fortsätt med doseringen med 12 timmars mellanrum och vid behov i 2 dygns tid. 1 dos innehåller 50 g kalcium. **Får:** 40 -50 ml då så snabbt som möjligt vid symptom av kalciumbrist. Dosen kan ges 2-4 gånger per dygn.



5 L

VILOFARM A/S

Søagervej 9 . Onsild
DK-9500 Hobro
ordre@vilofarm.dk

Vilofarm

Tel. +45 88 87 53 00